

高纯度 含量足  
应激小 毒性弱



布氏菌病活疫苗  
(M5株)

网址: <https://www.tcsw.com.cn> 电话: 0991-3930277  
地址: 新疆乌鲁木齐市头屯河区金屯路109号 邮编: 830022

天康制药股份有限公司  
TeconBiopharmaceutical Co., Ltd



# 布鲁氏菌病

布鲁氏菌病(BRUCELLOSIS，简称为“布病”)，是由布鲁氏菌(BRUCELLA)引起的一种多种动物以及人均可感染患病、急性或慢性的人兽共患传染病。动物感染后，主要影响动物的生殖系统及运动系统，导致流产、早产、不孕、睾丸炎、关节炎等。母羊感染后多以流产、早产、死胎、胎衣不下等为主要临床症状，公羊感染后，主要以睾丸炎、附睾炎、不育等为主要临床症状。羊种布病危害大，人感染后，症状明显损伤大，若治疗不及时，可引起长期感染或造成不可逆的损伤。



## 产品特点

- 1**  安全，多次传代  
毒力充分致弱  
对家畜安全，副反应小
- 2**  多道纯化工艺，高纯度配苗  
含量足，每头份含有布鲁氏菌M5株  
不低于10亿CFU
- 3**  冻干保护菌株  
加入稀释液后，快速溶解  
摇匀后即可使用，使用便捷
- 4**  高效防护  
一次免疫  
长久防护
- 5**  皮下注射、滴鼻、口服  
多种接种途径，方便操作

## 免疫程序

羔羊	4-5月龄，皮下注射，1头份 (不低于10亿CFU)；
未怀孕的成年羊	滴鼻，1头份(不低于10亿CFU)
	口服，25头份(不低于250亿CFU)

## 注意事项

- ① 怀孕动物慎用；
- ② 免疫前，对注射部位进行局部消毒处理；
- ③ 免疫操作人员，做好相应防护，避免人员暴露；
- ④ 用过的疫苗瓶、注射器等做无害化处理；
- ⑤ 免疫后，用安全的消毒剂对免疫动物圈舍，进行环境消毒。